



New Argentine Seedless Varieties INTA

Pugliese, M. B.; Quiroga, M. I.;
Barcia, Fernando A.; Pacheco, D.
E.; Infante, S.; Díaz, A. M.




Sorpresa INTA

- Bayas con sabor especial de 22 mm de calibre.
- Cosecha intermedia.



Fernandina INTA

- Bayas de 19 mm de calibre.
- Cosecha tardía.
- Plantas vigorosas y productivas.



Revelación INTA

- Calibre natural de 20 mm
- Racimo grande
- Muy productiva y de cosecha tardía




Serena INTA

- Bayas crujientes de 18 mm de calibre.
- Cosecha intermedia
- Responde a la aplicación de ácido giberélico, aunque este incrementa el desprendimiento de bayas.




Delicia INTA

- Bayas con sabor moscatel de 18 mm de calibre.
- Cosecha tardía.
- Recomendable cultivarla en regiones con clima fresco para obtener buen color.
- Flor hermafrodita, no necesita una variedad polinizadora.



Marisela INTA

- Bayas con sabor foxé
- Racimo chico
- Cosecha intermedia




Resistencia INTA

- Bayas crujientes
- Racimo mediano
- Cosecha tardía



Esperanza INTA


- Bayas color verde amarillento, con calibre natural de 19 mm
- Racimo mediano
- Cosecha temprana



Grandeza INTA

- Bayas con calibre natural de 21 mm
- Racimo grande
- Cosecha intermedia





215.169 ha Grapes
7.6% Table Grapes

16.434 ha



80 % San Juan Province



13% Mendoza

La Rioja
Río Negro
Neuquén
Catamarca
Salta

USDA

Sun
World

A.
Caratan

Sheehan
Genetics


IFG

Zaninovic

Gerawan
/Prima

Guimarra
/CVG
/ARD/Grapa

M.
Caratan



SEEDLES!!

Joyce Rita Ribarits

Eric Biggs

Andriske Table grapes

CSIRO

DPI

Malcolm David Cleggett

Ralli & Sons

Peter Michael Burne and Robert Garry Trezise

Delicia INTA






- Seedless
- Moscatel flavor
- Pink berry
- Natural size 18 mm
- Yield 20 kg vine⁻¹
- Late harvest
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 0 %)

VARIEDAD DELICIA INTA

Uvas de mesa sin semillas



FENOLOGÍA



CRECIMIENTO Y FERTILIDAD



RENDIMIENTO Y CALIDAD

PRODUCTIVIDAD
17 kg

DIÁMETRO DE LA BAYA
18 mm

PESO DEL RACIMO
400 g


BAYA

Crocancia, rudimento y sabor



HOJA


Pigmentación en nervadura principal



RACIMO



POSTCOSECHA



Responde a la aplicación de ácido giberélico para incrementar el tamaño de bayas. Color uniforme de bayas a los 21 días.

Serena INTA






- Seedless
- Crisp red berries
- Natural size 17mm
- Yield 23 kg vine⁻¹
- Intermediate harvest
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 5 %)

VARIEDAD
SERENA INTA

Lvas de mesa
sin semillas



FENOLOGÍA



CRECIMIENTO Y FERTILIDAD



RENDIMIENTO Y CALIDAD

PRODUCTIVIDAD
23 kg


DIÁMETRO DE LA BAYA
17 mm

PESO DEL RACIMO
500 g

BAYA
Crocancia,
rudimento y sabor



HOJA
Pigmentación en
nervadura principal



RACIMO



POSTCOSECHA



Cosecha 16° Brix.

Fernandina INTA





- Seedless
- Black berries
- Natural size 18 mm
- Yield 28 kg vine⁻¹
- Late harvest
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 0 %)

VARIEDAD FERNANDINA INTA

Uvas de mesa sin semillas



BAYA

Crocancia, rudimento y sabor

HOJA

Pigmentación en nervadura principal

Forma del limbo y seno peciolar

RACIMO

FORMA

TAMAÑO

COMPACIDAD

LONGITUD

POSTCOSECHA

Firmeza cosecha: 62

Firmeza 45 días: 56

Desgrane 45 días: 1%

Raquis cosecha: TURGENTE VERDE

Raquis 45 días: VERDE

Cosecha 15-16 °Brix. Muy productiva

Sorpresa INTA






- Seedless
- Black berries
- Natural size 22 mm
- Yield 22 kg vine⁻¹
- Intermediate harvest
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 0,3 %)

VARIEDAD SORPRESA INTA

Uvas de mesa sin semillas



FENOLOGÍA



CRECIMIENTO Y FERTILIDAD



RENDIMIENTO Y CALIDAD




BAYA

Crocancia, rudimento y sabor



HOJA


Pigmentación en nervadura principal



RACIMO




POSTCOSECHA





Revelación INTA






- Seedless
- Black berries
- Natural size 19 mm
- Yield 23 kg vine⁻¹
- Late harvest
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 0,3 %)

VARIEDAD
REVELACIÓN INTA Uvas de mesa sin semillas



Esperanza INTA






- Seedless
- Crisp Green
- Yellow berries
- Natural size 19mm
- Yield 19 kg vine⁻¹
- Early harvest
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 0 %)

VARIEDAD
ESPERANZA INTA



FENOLOGÍA



BAYA
Crocancia, rudimento y sabor

HOJA
Pigmentación en nervadura principal

RACIMO

FORMA

TAMAÑO

COMPACIDAD

LONGITUD

POSTCOSECHA

Firmeza cosecha **70**

Firmeza 45 días **65**

Desgrane 45 días **0%**

Raquis cosecha **TURGENTE VERDE**


Raquis 45 días **VERDE**

Cosecha 16 °Brix


FORMA DEL LIMBO Y SENO PECIOLAR

Grandeza INTA





- Seedless
- Green-yellow berries
- Natural size 19 mm
- Yield 20 kg vine⁻¹
- Early harvest
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 0 %)


VARIEDAD
GRANDEZA INTA Uvas de mesa sin semillas 


FENOLOGÍA


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ Brotación ■ Floración ■ Maduración

CRECIMIENTO Y FERTILIDAD

Vigor  +

Color del sarmiento  +

Fertilidad yemas basales  +


RENDIMIENTO Y CALIDAD

PRODUCTIVIDAD **20 kg**


DIÁMETRO DE LA BAYA **19 mm**

PESO DEL RACIMO **310 g**


BAYA
Crocancia, rudimento y sabor




HOJA
Pigmentación en nervadura principal





Forma del limbo y seno peciolar




RACIMO

FORMA


TAMAÑO


COMPACIDAD


LONGITUD


POSTCOSECHA

62

Firmeza cosecha

52

Firmeza 45 días

0%

Desgrane 45 días

TURBENTE VERDE

Raquis cosecha


VERDE

Raquis 45 días

Cosecha 15-16 °Brix.

Resistencia INTA





- Seedless
- Crisp Green
- Yellow berries
- Natural size 16 mm
- Yield 20 kg vine⁻¹
- Good Postharvest 45 days (Green rachis and Berry shatter 0 %)

The bunch maintain an excellent sanitary state, without rotting, even after long periods of permanence in the field. It has attitude for the elaboration of raisins.

VARIEDAD RESISTENCIA INTA

Uvas de mesa sin semillas

FENOLOGÍA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ Brotación ■ Floración ■ Maduración

CRECIMIENTO Y FERTILIDAD

Vigor:

Color del sarmiento:

Fertilidad yemas basales:

RENDIMIENTO Y CALIDAD

PRODUCTIVIDAD: **20 kg**

DIÁMETRO DE LA BAYA: **16 mm**

PESO DEL RACIMO: **350 g**

BAYA

Crocancia, rudimento y sabor

HOJA

Pigmentación en nervadura principal

Forma del limbo y seno peciolar

RACIMO

FORMA:

TAMAÑO:

COMPACIDAD:

LONGITUD:

POSTCOSECHA

Firmeza cosecha: **65**

Firmeza 45 días: **62**

Desgrane 45 días: **0%**


Raquis cosecha: **TURGENTE VERDE**

Raquis 45 días: **VERDE**

Racimo conserva un excelente estado sanitario, sin podredumbres, incluso después de largos períodos de permanencia en el campo. Posee actitud para elaboración de pasa. Cosecha uva en fresco 1ª Semana Enero 15-16 *Brx.

Coordinadora: Silvia Ulanovsky
 María Beatriz Pugliese - pugliese.maria@inta.gob.ar
 Fernando Barcia y María I. Quiroga

Marisela INTA



RAISINS





75



69



Fernandina INTA



77



89




Sorpresa INTA



70



Esperanza INTA



Resistencia INTA



THANK YOU
Muchas gracias

pugliese.maria@inta.gob.ar